

Protectol® schützt (I)

UN 1219

WGK 1 (PG II)

G00001 + S0805184

DE

(D) Gefahr

Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. Verursacht schwere Augenreizung. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Etikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. **BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:** Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Behälter dicht verschlossen halten. Inhalt/Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen.

(CH) BASF Schweiz AG, Churerstrasse 78, CH-8808 Pfaeffikon, Tel. +49 (0)180 2273 112

BASF SE
67056 Ludwigshafen Germany

4,2 kg net Tel. +49 1802273 112

(D) Wirkstoffgehalt: 75%(v/v) flüssige, wässrige Propan-2-ol-Lösung (CAS 67-63-0, WHO-Empfehlung) zur professionellen hygienischen Händedesinfektion (medizinisch/pflegerischer Bereich): bakterizid, levurizid, begrenzt viruzid; BAuA AllgVg v. 13.3.2020; Ablauf 8.9.2020

Nur für äußerliche Anwendung. Kontakt mit den Augen vermeiden. Erste Hilfe: Allgemein: Helfer auf Selbstschutz achten. Bei Gefahr der Bewusstlosigkeit, Lagerung und Transport in stabiler Seitenlage. Verunreinigte Kleidung sofort entfernen; Nach Einatmen: Ruhe, Frischluft, ärztliche Hilfe. Nach Hautkontakt: Keine Gefährdungen zu erwarten. Nach Augenkontakt: 15 Minuten bei gespreizten Lidern unter fließendem Wasser gründlich ausspülen, Vorstellung beim Augenarzt. Nach Verschlucken: Sofort Mund ausspülen und 200-300 ml Wasser nachtrinken, ärztliche Hilfe. Hinweise für den Arzt: Symptomatische Behandlung (Dekontamination, Vitalfunktionen), kein spezifisches Antidot bekannt. Lagerung: Das Produkt ist brennbar. Dämpfe können mit Luft ein explosionsfähiges Gemisch bilden. Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen. Behälter dicht geschlossen halten und an einem kühlen, gut belüfteten Ort aufbewahren. Biozidprodukte für die menschliche Hygiene (Händedesinfektion): PT 1 Zur hygienischen Händedesinfektion. Für die Desinfektion von Schleimhäuten nicht geeignet, nicht in unmittelbarer Nähe offener Wunden anwenden. Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung: min. 3 ml innerhalb 30 Sekunden in die trockenen Hände einreiben, bis die Hände getrocknet sind; ohne abzuspülen Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen

Herstelldatum

03.2020

